

ЭЛЕМЕНТАРНО
ЛУЧШЕ

ТОВАРНЫЙ ВИД



Овощи
2026



СТОМП®
ПРОФЕССИОНАЛ™

Рекомендации по применению
препараторов BASF для защиты
овощных культур в России

 **BASF**
We create chemistry

Высокое качество

T
400

ЭЛЕМЕНТАРНО. BASF

Продовольственная безопасность — обеспечение населения продуктами питания в том объеме и том качестве, которые необходимы для активной и здоровой жизни. Мы следим за **качеством** наших решений на всей цепочке от производства до поставки, а также принимаем все необходимые меры, чтобы продукты BASF использовались эффективно и в соответствии с нормами безопасности.

Томат



N

7

Надежность

СОДЕРЖАНИЕ

<u>СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ</u>	4
ГЕРБИЦИДЫ	
<u>СТОМП® ПРОФЕССИОНАЛ</u>	9
<u>БУТИЗАН® 400</u>	16
ФУНГИЦИДЫ	
<u>ОРВЕГО®*</u>	19
<u>СИГНУМ®</u>	27
<u>РАЦИОНАЛЬНОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО</u>	36

* Здесь и далее — препарат в процессе перерегистрации. Информация не является рекламой и предназначена для информирования о расширении ассортимента продукции в будущем, продукт будет доступен к заказу только с момента гос. регистрации.

Схемы применения



ГЕРБИЦИДЫ

**БУТИЗАН® 400
СТОМП® ПРОФЕССИОНАЛ**



ФУНГИЦИДЫ

ОПВЕГО®*
СИГНУМ®

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ЛУКА

AgCelence
СИГНУМ®

ОРВЕГО®*

СТОМП®
ПРОФЕС-
СИОНАЛ™*

1,0–1,5 кг/га (макс. 2 обработки)

0,8–1,0 л/га (макс. 3 обработки)

1,7–3,23 л/га (макс.
1 обработка) или
1,7–3,23 л/га
(макс. 1 обработка)

Фазы
развития



СИСТЕМА ЗАЩИТЫ МОРКОВИ

AgCelence
СИГНУМ®

СТОМП®
ПРОФЕС-
СИОНАЛ™

0,75–1,0 кг/га (макс. 2 обработки)

3,25–3,5 л/га (макс.
1 обработка) или
3,25–3,5 л/га
(макс. 1 обработка)

Фазы
развития



* Здесь и далее — препарат в процессе перерегистрации. Информация не является рекламой и предназначена для информирования о расширении ассортимента продукции в будущем, продукт будет доступен к заказу только с момента гос. регистрации.

** Кроме лука на перо.

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ КАПУСТЫ

AgCelence
СИГНУМ®
БУТИЗАН®
400
СТОМП®
ПРОФЕС-
СИОНАЛ

1,0–1,2 кг/га (макс. 3 обработки)

1,5–2,0 л/га

2,2–4,35 л/га
(макс. 1 обработка)



СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ТОМАТА В ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ

AgCelence
СИГНУМ®
ОРВЕГО®*

1,0–1,5 кг/га (макс. 2 обработки)

0,8–1,0 л/га (макс. 3 обработки)



* Здесь и далее — препарат в процессе перерегистрации. Информация не является рекламой и предназначена для информирования о расширении ассортимента продукции в будущем, продукт будет доступен к заказу только с момента гос. регистрации.

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОГУРЦА

AgScience
СИГНУМ®
ОРВЕГО®*

1,0–1,5 кг/га (макс. 2 обработки)


0,8–1,0 л/га (макс. 3 обработки)



СИСТЕМА ЗАЩИТЫ САЛАТА

ОРВЕГО®*


0,8–1,0 л/га (макс. 3 обработки)



* Здесь и далее — препарат в процессе перерегистрации. Информация не является рекламой и предназначена для информирования о расширении ассортимента продукции в будущем, продукт будет доступен к заказу только с момента гос. регистрации.

Гербициды

СТОМП® ПРОФЕССИОНАЛ..... 9
БУТИЗАН® 400..... 16



Пираクロстробин



BASF

We create chemistry

СТОМП® ПРОФЕССИОНАЛ

- Большее содержание д. в. на литр продукта
- Большая селективность по отношению к культуре и расширенное окно применения: возможно применение после всходов культуры
- Отсутствие запаха, окрашивания и простота в смывании с рабочих поверхностей
- Более продолжительное действие — благодаря непрерывному высвобождению д. в. из микрокапсул
- Широкий спектр действия

СТОМП® ПРОФЕССИОНАЛ

Инновационная препаративная форма пендиметалина — для улучшенного контроля широкого спектра однодольных и двудольных сорняков в посевах овощных культур

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕПАРАТА

Действующее вещество	Пендиметалин (455 г/л)
Препаративная форма	Микрокапсулированная суспензия (МКС)
Культуры	Норма расхода
Лук всех генераций (кроме лука на перо)	1,70–3,23 л/га
Морковь	3,25–3,50 л/га
Капуста белокочанная (кроме раннеспелых и среднеспелых сортов)	2,20–4,35 л/га
Спектр действия	Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Применение	Лук: опрыскивание почвы до всходов или в фазу «петелька» культуры; Морковь: опрыскивание почвы до всходов или вегетирующих растений в фазу всходов культуры; Капуста белокочанная: опрыскивание почвы до высадки рассады в грунт
Срок ожидания (кратность обработки)	60 (1)
Упаковка	Пластиковые канистры 2 x 10 л

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

Благодаря микрокапсулам действующее вещество, попадая на поверхность почвы, высвобождается постепенно, тем самым prolongируется гербицидная активность препарата. Пендиметалин поглощается корнями и побегами

прорастающих сорняков и ингибирует деление клеток меристемы. Подвергшиеся действию гербицида сорняки погибают вскоре после прорастания или появления всходов.



Воздействие на лист — клетка растения с частицей действующего вещества (схематическое изображение)





Частицы действующего вещества на корне (схематическое изображение)

ПРЕИМУЩЕСТВА


По сравнению с обычной формулацией пендиметалина, действующее вещество (д. в.) гербицида СТОМП ПРОФЕССИОНАЛ заключено в микрокапсулы, что обеспечивает:

- 1 БОЛЬШЕЕ СОДЕРЖАНИЕ Д. В. НА ЛИТР ПРОДУКТА**
- 2 БОЛЬШУЮ СЕЛЕКТИВНОСТЬ ПО ОТНОШЕНИЮ К КУЛЬТУРЕ И РАСШИРЕННОЕ ОКНО ПРИМЕНЕНИЯ: ВОЗМОЖНО ПРИМЕНЕНИЕ ПОСЛЕ ВСХОДОВ КУЛЬТУРЫ**
- 3 ОТСУСТВИЕ ЗАПАХА, ОКРАШИВАНИЯ И ПРОСТОТА В СМЫВАНИИ С РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ**
- 4 БОЛЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ — БЛАГОДАРЯ НЕПРЕРЫВНОМУ ВЫСВОБОЖДЕНИЮ Д. В. ИЗ МИКРОКАПСУЛ**
- 5 ШИРОКИЙ СПЕКТР ДЕЙСТВИЯ**

При сильном увеличении можно увидеть основное отличие препарата СТОМП ПРОФЕССИОНАЛ от старой препаративной формы (КЭ): множество мельчайших микрокапсул «плавают» в водном растворе, свободном от органических растворителей. Стенки капсул состоят из надежного полимерного материала, который обеспечивает хорошую защиту для действующего вещества. Микрокапсулирование обеспечивает высокий уровень стабильности препарата, даже если продукт хранится в течение длительного времени.




Микрокапсулы СТОМП ПРОФЕССИОНАЛ при тысячекратном увеличении



Микрокапсулы СТОМП ПРОФЕССИОНАЛ при увеличении в миллионы раз



Пендиметалин в микрокапсулах (схематическое изображение)



Разорвавшаяся микрокапсула с высвободившимися частицами действующего вещества (схематическое изображение)

1 БОЛЬШЕЕ СОДЕРЖАНИЕ Д. В. НА ЛИТР ПРОДУКТА

За счет микрокапсулирования СТОМП ПРОФЕССИОНАЛ содержит практически на 40 % больше действующего вещества, чем в старой препартивной форме (концентрат эмульсии, 330 г/л).

Это позволяет сократить норму расхода препарата, а соответственно сокращаются время на приготовление рабочего раствора и расходы на утилизацию тары.

2 БОЛЬШАЯ СЕЛЕКТИВНОСТЬ ПО ОТНОШЕНИЮ К КУЛЬТУРЕ И РАСШИРЕННОЕ ОКНО ПРИМЕНЕНИЯ: ВОЗМОЖНО ПРИМЕНЕНИЕ ПОСЛЕ ВСХОДОВ КУЛЬТУРЫ

Благодаря инновационной микрокапсулированной препартивной форме гербицида СТОМП ПРОФЕССИОНАЛ значительно снижается риск фитотоксичного действия пендиметалина

на овощные культуры, что существенно расширяет возможности его применения во время вегетации.

3 ОТСУТСТВИЕ ЗАПАХА, ОКРАШИВАНИЯ И ПРОСТОТА В СМЫВАНИИ С РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

СТОМП ПРОФЕССИОНАЛ позволяет без проблем сполоскивать и мыть все емкости и аппараты, контактирующие с ним, так как действующее

вещество надежно защищено в микрокапсулах. На рабочих поверхностях агрегатов не остается никаких красящих остатков.

4 БОЛЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ БЛАГОДАРЯ НЕПРЕРЫВНОМУ ВЫСВОБОЖДЕНИЮ Д. В. ИЗ МИКРОКАПСУЛ

После распыления наибольшая доля действующего вещества остается в защищенном состоянии внутри капсул. Теплая погода и влага способствуют набуханию и раскрытию

микрокапсул, что оптимизирует защитное действие гербицида: действующее вещество высвобождается именно тогда, когда создаются условия для прорастания сорняков.

НЕ ОКРАШИВАЕТ!



Приготовление рабочего раствора с гербицидом СТОМП ПРОФЕССИОНАЛ



Простое ополаскивание водой



После промывки рабочие поверхности остаются чистыми

5 ШИРОКИЙ СПЕКТР ДЕЙСТВИЯ

СТОМП ПРОФЕССИОНАЛ эффективен против широкого спектра однолетних сорняков и зарегистрирован для применения на основных овощных культурах как до всходов, так и после.

СПЕКТР ДЕЙСТВИЯ

ДВУДОЛЬНЫЕ СОРНЯКИ		ЗЛАКОВЫЕ СОРНЯКИ
Вероника, виды	Торица полевая	Мятлик, виды
Звездчатка средняя	Фиалка полевая	Щетинник, виды
Мак самосейка	Ширица, виды	Просо, виды
Марь, виды	Яснотка, виды	Росичка кроваво-красная
Незабудка полевая	Горец почечуйный	
Осот огородный	Дымянка лекарственная	
Осот полевой (из семян)	Паслён чёрный	
Осот шероховатый	Резеда	
Очный цвет полевой	Ромашка аптечная	
Пастушья сумка	Ярутка полевая	
Пикульник	Ясколка скученная	
Повилика европейская	Герань маленькая	
Портулак огородный	Галинсога мелкоцветковая	
Ромашка непахучая		

— чувствительный, — среднечувствительный, — малочувствительный, — устойчивый



Мамонов Владислав Юрьевич, агроном по СЗР
АО «Победа», Ломоносовский район, Ленинградская область

Отличный препарат, работаем не первый год. Позволяет остановить несколько волн сорняков, включая марь, горцы. При правильно подобранный гербицидной схеме удается избежать прополки, на которую затраты в год могут составить более 1,5 млн руб. Таким образом, экономим время и деньги. Последействие не наблюдалось. Хорошо работает в засуху, что также является неоспоримым плюсом.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Составление баковых смесей

СТОМП ПРОФЕССИОНАЛ — идеальный партнер в баковых смесях для широкого спектра гербицидов, фунгицидов и инсектицидов. При составлении баковых смесей на основе гербицида СТОМП ПРОФЕССИОНАЛ необходимо учитывать, что гербицид СТОМП ПРОФЕССИОНАЛ нельзя смешивать с препаратами на основе органических растворителей (например, концентраты эмульсий).

Применение гербицидов и полив

После обработки гербицидом СТОМП ПРОФЕССИОНАЛ необходимо выждать до полива от 24 до 48 часов. В этот период СТОМП ПРОФЕССИОНАЛ прочно связывается с поверхностным слоем почвы и образует надежный гербицидный экран (при использовании гербицида БУТИЗАН 400 увлажнение почвы является залогом успеха). Рекомендуется произвести полив участка до применения гербицида БУТИЗАН 400.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОЛИВУ




СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ

ЛУК



КАПУСТА



* Кроме лука на перо.

МОРКОВЬ



БУТИЗАН® 400


Гербицид для борьбы с широким спектром однолетних злаковых и двудольных сорняков на крестоцветных культурах

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕПАРАТА

Действующее вещество	Метазахлор (400 г/л)
Препартивная форма	Концентрат суспензии (КС)
Норма расхода	1,5–2,0 л/га
Культура	Капуста белокочанная (кроме раннеспелых сортов)
Спектр действия	Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Применение	Опрыскивание почвы через 1–7 дней после высадки рассады с обязательным последующим поливом
Упаковка	Пластиковые канистры 4 x 5 л

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

Метазахлор относится к группе хлорацетанилидов. Проникая через гипокотиль и корни, блокирует прорастание семян, кроме того, у злаковых сорняков действующее вещество препарата проникает в основном через колеоптиль, при этом росток скручивается и вслед за этим гибнет. В двудольные метазахлор проникает также через семядоли, вызывая их гибель. Первые признаки обнаруживаются в торможении роста корня, вследствие чего проросток погибает до того, как появится на поверхности. Среднечувствительные сорняки появляются на поверхности почвы, но имеют очень слабые (нежизнеспособные) всходы, погибающие в течение 3–7 дней. При послевсходовом применении у чувствительных сорняков прекращается рост, затем они меняют окраску и отмирают.



СПЕКТР ДЕЙСТВИЯ

ДВУДОЛЬНЫЕ СОРНЯКИ		ЗЛАКОВЫЕ СОРНЯКИ
Вероника, виды	Галинсога, виды	Лисохвост полевой
Звездчатка средняя	Горец вьюнковый	Метлица обыкновенная
Крестовник обыкновенный	Горец почечуйный	Мятлик однолетний
Осот желтый	Купавка обыкновенная	Просо куриное
Паслен черный	Мак самосейка	Росичка, виды
Подмаренник цепкий	Пикильник обыкновенный	Щетинник, виды
Ромашка, виды	Щирица запрокинутая	
Торица полевая	Пастушья сумка	
Череда трехраздельная	Дымянка аптечная	
Яснотка пурпурная	Ярутка полевая	

— чувствительный, — среднечувствительный, — малочувствительный, — устойчивый

ПРЕИМУЩЕСТВА

- 1 ВЫСОКАЯ БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОТИВ БОЛЬШИНСТВА ОДНОЛЕТНИХ ДВУДОЛЬНЫХ И ЗЛАКОВЫХ СОРНЯКОВ
- 2 ВЫСОКАЯ СЕЛЕКТИВНОСТЬ
- 3 НЕ ТРЕБУЕТ ЗАДЕЛКИ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Подготовка почвы к высадке рассады
- Высадка рассады в течение 1–2 дней
- Внесение гербицида в течение следующих 4 дней

■ Полив в течение суток после обработки гербицидом (чем скорее после посева/высадки внесен гербицид и осуществлен полив, тем выше его эффективность, так как основной объект воздействия — это набухающие и прорастающие семена сорняков)

СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ

КАПУСТА



Фунгициды

ОРВЕГО®*	19
СИГНУМ®	27

* Здесь и далее — препарат в процессе перерегистрации. Информация не является рекламой и предназначена для информирования о расширении ассортимента продукции в будущем, продукт будет доступен к заказу только с момента гос. регистрации.

Боскалид





ОРВЕГО®*

**Максимальный потенциал
здорового урожая!**

- Инновационное действующее вещество из нового класса химических соединений
- Отличный результат при сложных погодных условиях (длительные и обильные осадки/дождевание)
- Непревзойденная защита от фитофтороза и пероноспороза
- Отличные экотоксикологические характеристики

*Здесь и далее — препарат в процессе перерегистрации. Информация не является рекламой и предназначена для информирования о расширении ассортимента продукции в будущем, продукт будет доступен к заказу только с момента гос. регистрации.

 **BASF**

We create chemistry



Комбинированный фунгицид нового поколения для защиты овощных культур от заболеваний, вызываемых оомицетами

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕПАРАТА

Действующие вещества	INITIUM® (аметоктрадин, 300 г/л) + диметоморф (225 г/л)	
Препартивная форма	Концентрат супензии (КС)	
Культуры	Норма расхода	Вредный объект
Томат открытого грунта	0,8–1,0 л/га	Фитофтороз
Огурец открытого грунта	0,8–1,0 л/га	Пероноспороз
Лук (на репку)	0,8–1,0 л/га	Пероноспороз
Салат	0,8–1,0 л/га	Ложная мучнистая роса
Применение	Опрыскивание в период вегетации: первое — профилактическое, последующие — с интервалом 10–15 дней	
Срок ожидания (кратность обработки)	10 (3)	
Упаковка	Канистры 4 × 5 л	

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ В РАСТЕНИИ

INITIUM — контактный компонент ОРВЕГО. Абсорбируясь в восковом слое кутикулы листа, INITIUM образует устойчивый внешний защитный экран. В ткани листа проникает менее 10 % от общего количества действующего вещества, основная его часть остается на поверхности листьев в восковом слое, прочно связываясь с ним и не вымываясь. Наличие такого своеобразного «депозитария» на поверхности растения обеспечивает длительное профилактическое действие

препарата. При этом под воздействием влаги (например, росы или дождя) частицы препарата INITIUM постепенно высвобождаются из этих «депо», что ведет к поддержанию высокой степени защиты растений от фитофтороза и пероноспороза.

Диметоморф проникает в растительную ткань и распределяется в ней трансламинарно и акропетально, обеспечивая защиту всех частей растений, даже не покрытых обработкой.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

Действующее вещество INITIUM принадлежит к совершенно новому классу действующих веществ — триазолопиримидиламинов (triazolo-pyrimidylamine). К данному классу полностью отсутствует устойчивость у оомицетов. INITIUM имеет отличный от других действующих веществ механизм действия: оказывает ингибирующее воздействие на комплекс III — фермент в клетках патогенных оомицетов, входящий в митохондриальную дыхательную цепь. Нарушение функционирования этой цепи обусловливает быстрое снижение уровня аденоzinтрифосфата (АТФ), являющегося источником энергии для клеточных процессов; его нехватка ведёт

к гибели гриба. При этом место действия INITIUM в комплексе III отлично от места действия всех остальных действующих веществ, присутствующих на рынке России.


Диметоморф ингибирует формирование клеточных стенок гриба на всех стадиях их развития. Диметоморф убивает проникший в растение мицелий гриба в течение 1–2 суток после заражения. Это гарантирует успех в случае начавшегося, но не проявившегося внешне заболевания. Диметоморф существенно снижает спороношение гриба *Plasmopara viticola* и образование половых структур — ооспор.

* Здесь и далее — препарат в процессе перерегистрации. Информация не является рекламой и предназначена для информирования о расширении ассортимента продукции в будущем, продукт будет доступен к заказу только с момента гос. регистрации.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- 1 ИННОВАЦИОННОЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО ИЗ НОВОГО КЛАССА ХИМИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
 - 2 ОТЛИЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРИ СЛОЖНЫХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЯХ (ДЛЯТЕЛЬНЫЕ И ОБИЛЬНЫЕ ОСАДКИ/ДОЖДЕВАНИЕ)
 - 3 НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ ЗАЩИТА ОТ ФИТОФТОРОЗА И ПЕРОНОСПОРОЗА
 - 4 ОТЛИЧНЫЕ ЭКОТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- 1 ИННОВАЦИОННОЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО ИЗ НОВОГО КЛАССА ХИМИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ





В состав комбинированного фунгицида ОРВЕГО входят два действующих вещества: диметоморф и INITIUM (аметоктрайдин). Они предотвращают развитие возбудителя как на поверхности растения, так и в его тканях, обеспечивая длительный профилактический эффект.



2 ОТЛИЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРИ СЛОЖНЫХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЯХ (ДЛЯТЕЛЬНЫЕ И ОБИЛЬНЫЕ ОСАДКИ/ДОЖДЕВАНИЕ)

Устойчивость к смыванию осадками — один из основополагающих критерииев при выборе фунгицида для защиты овощных культур. Особую актуальность данное свойство приобретает при выращивании овощей в условиях полива.

ОРВЕГО обладает превосходной дождеустойчивостью за счет химико-физических свойств двух компонентов: INITIUM и диметоморфа, а также за счет инновационной формуляции препарата.




Частицы INITIUM на листьях. INITIUM распределяется на поверхности листа в виде пленки, прочно связываясь с восковым слоем и образуя «депо» препарата. Изображение получено способом сканирующей электронной микроскопии

При этом под воздействием влаги (например, росы или дождя) частицы препарата INITIUM постепенно высвобождаются из этих «депо», что ведет к поддержанию высокой степени защиты растений от фитофтороза и пероноспороза.



После внесения



2 цикла осадков




4 цикла осадков

Под воздействием влаги INITIUM перераспределяется в восковом слое растущих листьев — из уже существующих тканей во вновь появившиеся участки, увеличивая покрытую препаратом площадь

Диметоморф — локально-системный компонент ОРВЕГО. Быстро проникает в ткани растений и перемещается акропетально внутри растения, контролируя развитие оомицета изнутри.


Л/ГА	КОНТАКТНАЯ АКТИВНОСТЬ	ПОГЛОЩЕНИЕ ВОСКОВЫМ СЛОЕМ	ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ПОВЕРХНОСТИ	ТРАНСЛАМИНАРНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ	АКРОПЕТАЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ	БАЗИПЕТАЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ
INITIUM	300	++	+++	+++	0	0
DMM	225	+	+	0	+++	++



- INITIUM И ДИМЕТОМОРФ ВЗАИМОДОПОЛНЯЮТ ДРУГ ДРУГА, ОБЕСПЕЧИВАЯ ОТЛИЧНУЮ ЗАЩИТУ РАСТЕНИЯ СНАРУЖИ И ИЗНУТРИ ПРИ ЛЮБЫХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЯХ.

ОРВЕГО — это современный концентрат супензии на водной основе. За счет инновационной препаративной формы ОРВЕГО:

- Быстро и равномерно распределяется в рабочем растворе




- Отлично поглощается растением, при нанесении препарата не происходит потери действующего вещества
- Гибок в отношении нормы расхода рабочей жидкости

3 НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ ЗАЩИТА ОТ ФИТОФТОРОЗА И ПЕРОНОСПОРОЗА

ОРВЕГО — специализированный фунгицид для защиты растений от заболеваний, вызываемых оомицетами, в частности от фитофтороза картофеля и томатов и пероноспороза лука и огурца. Даже при очень низких концентрациях препарата зооспоры оомицетов (возбудителя

фитофтороза — *Phytophthora infestans*) быстро разрушаются, что приводит к прекращению цикла воспроизведения патогена. Кроме того, ОРВЕГО надежно подавляет функционирование зооспорангииев (органов размножения оомицетов).



■ ОРВЕГО ПРЕДОТВРАЩАЕТ РАЗВИТИЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ КАК НА ПОВЕРХНОСТИ РАСТЕНИЯ, ТАК И В ЕГО ТКАНЯХ, ОБЕСПЕЧИВАЯ ДЛИТЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛЕЧЕБНЫЙ ЭФФЕКТ (НА РАННИХ ЭТАПАХ ЗАРАЖЕНИЯ), ТАКЖЕ ОБЛАДАЕТ ОТЛИЧНЫМ АНТИСПОРООБРАЗУЮЩИМ ДЕЙСТВИЕМ.

В целях достижения максимальной эффективности рекомендуется профилактическое внесение препарата.

4 ОТЛИЧНЫЕ ЭКОТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Согласно данным, полученным при регистрации в ЕС, странах СНГ и России, фунгицид ОРВЕГО является практически безопасным для человека и окружающей среды. Он обладает превосходным профилем характеристик — в частности

очень благоприятными показателями в плане токсикологии и экотоксикологии, что обуславливает отличные гарантии безопасности для операторов, потребителей и окружающей среды.

Классы свойств и экологической опасности препарата ОРВЕГО (КС)*:

ОБЪЕКТ	КЛАСС СВОЙСТВА
ВОДНЫЕ ОРГАНИЗМЫ	Рыбы Слаботоксичный
	Зоопланктон Практически не токсичный
	Водоросли Слаботоксичный
ПОЧВЕННЫЕ ОРГАНИЗМЫ (ДОЖДЕВЫЕ ЧЕРВИ)	Практически не токсичный
ПТИЦЫ	Практически не токсичный
ПЧЕЛЫ	Практически не токсичный (3 класс опасности**: малоопасный)

* Согласно ГОСТам и установленным классам опасности в РФ.

** По классификации ВНИИВСГЭ.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ОРВЕГО отлично вписывается в стратегию борьбы с фитофторозом томата и пероноснотропозом лука и огурца. Для получения надежного защитного эффекта рекомендуется проводить обработки профилактически на ранних этапах вегетации. Новое действующее вещество INITIUM является эффективным элементом антирезистентной программы. Короткий срок ожидания позволяет также проводить опрыскивания за 10 дней до уборки урожая. Эффективная норма расхода в стандартных условиях — 0,8 л/га.

В экстремальных условиях (сильная инфекционная нагрузка, эпифитотия, восприимчивый сорт, активный рост) норму расхода можно увеличить до 1,0 л/га.

Для борьбы с ложной мучнистой росой на салате необходимо применять фунгицид ОРВЕГО профилактически, начиная с фазы «9–10 листьев», с интервалом 10–15 дней. Максимум 3 обработки за сезон.

СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ

ТОМАТ




ЛУК



ОГУРЕЦ



САЛАТ



СИГНУМ®

Идеальный баланс:
товарный вид +
здоровье овощей

- Действующие вещества из различных химических групп и встроенное управление резистентностью
- Новый уровень контроля комплекса болезней овощей
- Высокая рентабельность производства
- AgCelence-эффект



Инновационный двухкомпонентный фунгицид с ярко выраженным AgCelence-эффектом для защиты овощных культур от комплекса болезней

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕПАРАТА

Действующие вещества	Боскалид (267 г/кг) + пираклостробин (67 г/кг)	
Препартивная форма	Водно-диспергируемые гранулы (ВДГ)	
Культуры	Норма расхода	Вредный объект
Морковь	0,75–1,0 кг/га	
Томат открытого грунта	1,0–1,5 кг/га	Альтернариоз
Капуста белокочанная	1,0–1,2 кг/га	
Огурец открытого грунта	1,0–1,5 кг/га	
Лук (кроме лука на перо)	1,0–1,5 кг/га	Пероноспороз
Применение	Опрыскивание в период вегетации: первое — профилактическое, последующие — с интервалом 7–12 дней или 7–10 дней (для капусты белокачанной)	
Срок ожидания (кратность обработки)	14 (1–2), для капусты белокочанной — 7 (3)	
Упаковка	Пластиковые флаконы 10 x 1 кг	

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ В РАСТЕНИИ

При обработке часть действующего вещества боскалид остаётся на поверхности растения, другая проникает внутрь, распространяется трансламинарно и по сосудистой системе листа акропетально.

Пираклостробин относится к новому поколению действующих веществ из группы стробилюринов. Пираклостробин взаимодействует

с поверхностью растений, поглощаясь восковым слоем листьев и ягод, при этом на поверхности растения формируютсяочно связанные запасы действующего вещества, благодаря чему обеспечивается высокая устойчивость препарата к действию атмосферных осадков. Кроме того, пираклостробин проникает в ткани растения и обладает трансламинарной активностью, что также повышает его эффективность.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

Боскалид относится к химической группе карбоксамидов и обладает новым, уникальным механизмом действия — ингибирование сукцинатдегидрогеназы в митохондриальной цепи транспорта электронов. Боскалид блокирует ключевой этап дыхания клеток в комплексе II, в результате чего вызывает нарушение в цепи транспорта электронов в митохондриях гриба, что вызывает нарушение энергоснабжения патогенов.


Боскалид ингибирует прорастание спор, рост ростковых трубок, блокирует образование аппрессориев. У некоторых грибов воздействует также на развитие мицелия и спор.

Пираклостробин ингибирует митохондриальный цикл дыхания в дыхательном комплексе III. Пираклостробин блокирует энергоснабжение клеток гриба и вместе с тем жизненные процессы, связанные с этой функцией. Происходит ингибирование прорастания спор, роста ростковых трубок, блокируется образование аппрессориев.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- 1 ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ГРУПП И ВСТРОЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕЗИСТЕНТНОСТЬЮ
 - 2 НОВЫЙ УРОВЕНЬ КОНТРОЛЯ КОМПЛЕКСА БОЛЕЗНЕЙ ОВОЩЕЙ
 - 3 ВЫСOKАЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА
 - 4 AgCelence-ЭФФЕКТ
- 1 ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ГРУПП И ВСТРОЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕЗИСТЕНТНОСТЬЮ


СИГНУМ содержит два действующих вещества:
БОСКАЛИД и ПИРАКЛОСТРОБИН.



Боскалид начинает действовать там, где цикл трикарбоновых кислот и дыхательная цепь клеток гриба непосредственно связаны друг с другом — в так называемом комплексе II, представляющем собой центральный распределительный пункт в обмене веществ гриба. Здесь боскалид и блокирует обмен веществ патогена

- РАЗЛИЧНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ДЕЙСТВИЯ БОСКАЛИДА И ПИРАКЛОСТРОБИНА ПОЗВОЛЯЮТ
- СУЩЕСТВЕННО СНИЗИТЬ РИСК ВОЗНИКНОВЕНИЯ РЕЗИСТЕНТНОСТИ.

Распределение боскалида в листе огурца



- БОСКАЛИД И ПИРАКЛОСТРОБИН ПРИНАДЛЕЖАТ К РАЗНЫМ ХИМИЧЕСКИМ ГРУППАМ, ИМЕЮТ РАЗЛИЧНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ДЕЙСТВИЯ И СПОСОБЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ В РАСТЕНИИ, ЧТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОТСУСТВИЕ ПЕРЕКРЕСТНОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ И ЭФФЕКТИВНУЮ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНУЮ ЗАЩИТУ РАСТЕНИЯ.

2 НОВЫЙ УРОВЕНЬ КОНТРОЛЯ КОМПЛЕКСА БОЛЕЗНЕЙ ОВОЩЕЙ

СИГНУМ на луке




СИГНУМ на моркови



3 ВЫСОКАЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА


СИГНУМ на помидоре

Выход товарной продукции, т/га



Ростовская область, Мясниковский район

Выход товарной продукции, т/га



Краснодарский край, Павловский район

В опытах на томатах открытого грунта в условиях юга России добавление в систему фунгицида СИГНУМ значительно увеличило выход товарной продукции по сравнению с вариантом системы защиты хозяйства.

Экономическая эффективность применения СИГНУМ на помидоре

ПОКАЗАТЕЛЬ	РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ТОМАТ ЦЕНА: 35 000 руб./т		КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ ТОМАТ ЦЕНА: 35 000 руб./т	
	ХОЗ. СИСТЕМА	+ СИГНУМ (1,5 кг/га x 2)	ХОЗ. СИСТЕМА	+ СИГНУМ (1,0 кг/га x 1)
Урожайность, (т/га)	61,2	66,5	35,4	40,7
Прибавка урожайности, (т/га)	+ 5,3			+ 5,3
Выручка, (руб./га)	2 142 000	2 327 500	1 239 000	1 424 500
Дополнительная выручка, (руб./га)		185 500		185 500
Дополнительные затраты*, (руб./га)		43 776		14 592
Дополнительная прибыль**, (руб./га)	+ 141 724			+ 170 908

* Дополнительные затраты на СИГНУМ (в ценах официального прайс-листа без НДС на период 2026 г.) по сравнению с фунгицидом, применяемым в хозяйственной схеме.

** Расчет прибыли и цены на продукцию на период 2026 г.

Отличия в системах защиты:

Опыт №1: в системе защиты на варианте BASF две обработки стандартным фунгицидом, применяемым в хозяйстве, заменены на СИГНУМ (1,5 кг/га)

Опыт №2: в системе защиты на варианте BASF одна обработка стандартным фунгицидом, применяемым в хозяйстве, заменена на СИГНУМ (1,0 кг/га)




Опыты с применением фунгицидов на основе боскалида показали, что боскалид не только повышает урожайность различных овощных культур, но также значительно увеличивает выход товарной продукции и улучшает качество собранного урожая.

Также было доказано, что пираклостробин повышает переносимость растениями специфических «стрессов», улучшает фотосинтетическую активность и усвояемость растительным организмом почвенного азота. Это позволяет создать оптимальные условия для достижения высокой урожайности и качества.

ОПЫТНЫЕ ДАННЫЕ

ПРИМЕНЕНИЕ ОРВЕГО И СИГНУМ В РАМКАХ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ТОМАТА

Хозяйственная эффективность системы BASF на томате, регион Северный Кавказ



Хоз. система: 7 обработок

Система BASF: 7 обработок
(2,4,7-я обработки — ОРВЕГО 1,0 л/га,
5,6-я обработка — СИГНУМ 1,25 кг/га)

Brix является одним из важнейших показателей качества плодов. Это мера, характеризующая общее содержание сухих веществ в плодах. Чем выше уровень Brix, тем больше выход томатной пасты из единицы объема плодов томата.

СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ

ТОМАТ

AgCelence
СИГНУМ®

1,0–1,5 кг/га (макс. 2 обработки)



МОРКОВЬ

AgCelence
СИГНУМ®

0,75–1,0 кг/га (макс. 2 обработки)



ЛУК

AgCelence
СИГНУМ®

1,0–1,5 кг/га (макс. 2 обработки)



ОГУРЕЦ

AgCelence
СИГНУМ®

1,0–1,5 кг/га (макс. 2 обработки)



КАПУСТА

AgCelence
СИГНУМ®

1,0–1,2 кг/га (макс. 3 обработки)



Для борьбы с альтернариозом капусты необходимо применять фунгицид СИГНУМ профилактически, начиная со стадии «начало формирования кочана». В случае интенсивного развития инфекции необходимо проводить защиту в комбинации с фунгицидами из других химических классов.

Nunhems — ВАШ ГЛОБАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

Мы создаем инновационные гибриды и решения
для завтрашнего дня.

Под брендом Nunhems компания BASF предлагает гораздо больше
чем семена овощных культур. Мы предоставляем партнерские
отношения и клиентоориентированные решения на всех этапах работы.
От фермера, перерабатывающих предприятий, рассадных комплексов,
дилеров, трейдеров, розничных сетей до индустрии общественного
питания. В работе мы максимально учитываем тенденции развития
отрасли и желания потребителя.

каталог



 **BASF**

We create chemistry


nunhems®

РАЦИОНАЛЬНОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

УЧИТАЙТЕ ФАКТОРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:
СКОРОСТЬ И НАПРАВЛЕНИЕ ВЕТРА,
ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА И
РАССТОЯНИЕ ДО ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

≤3–5 м/с



СОДЕРЖАНИЕ ТЕХНИКИ В ЧИСТОТЕ ПРОДЛЕВАЕТ СРОК ЕЁ ЭКСПЛУАТАЦИИ, А ТАКЖЕ МИНИМИЗИРУЕТ РАСХОДЫ НА ЗАМЕНУ ДЕТАЛЕЙ



ОПТИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ПРИ ДВИЖЕНИИ ТРАКТОРА УМЕНЬШАЕТ СНОС ПРЕПАРАТА И УЛУЧШАЕТ УСТОЙЧИВОСТЬ ШТАНГИ

12 км/ч



ОТКАЛИБРОВАННАЯ СИСТЕМА РАСПЫЛЕНИЯ УВЕЛИЧИВАЕТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБРАБОТКИ И СВОДИТ РИСК СНОСА ПРЕПАРАТА К МИНИМУМУ

ОЧЕНЬ КРУПНЫЕ



КРУПНЫЕ



СРЕДНИЕ



МЕЛКИЕ



ОЧЕНЬ МЕЛКИЕ

ВЫБИРАЙТЕ ОПТИМАЛЬНЫЙ РАСХОД РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ ВО ИЗБЕЖАНИЕ СНИЖЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕПАРАТА



МОБИЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ BASF:

Архангельск	(910) 582-89-12	Москва	(910) 582-89-12
Астрахань.....	(927) 256-50-24	Нальчик	(918) 720-03-63
Барнаул.....	(913) 016-07-43	Нижний Новгород.....	(917) 003-14-98
.....	(983) 602-51-07	Новосибирск.....	(913) 016-07-43
Белгород.....	(915) 529-55-83	(983) 602-51-07
Биробиджан.....	(914) 557-22-08	Омск	(983) 181-95-90
Благовещенск.....	(914) 041-25-80	(983) 602-51-07
Брянск.....	(910) 582-89-12	Орел	(919) 267-84-31
Великий Новгород.....	(910) 582-89-12	Оренбург	(987) 770-54-68
Владивосток	(914) 557-22-08	Пенза.....	(963) 100-00-65
Владимир.....	(910) 582-89-12	Псков	(910) 582-89-12
Волгоград.....	(927) 256-50-24	Ростов-на-Дону	(989) 610-09-26
Вологда.....	(910) 582-89-12	Рязань	(910) 582-89-12
Воронеж.....	(919) 180-25-28	Самара.....	(987) 162-08-00
.....	(980) 554-50-23	Санкт-Петербург	(910) 582-89-12
Екатеринбург	(983) 181-95-90	Саранск.....	(917) 003-14-98
.....	(983) 602-51-07	Саратов	(987) 834-34-00
Иваново	(910) 582-89-12	(917) 021-02-08
Иркутск	(913) 016-07-43	Смоленск	(910) 582-89-12
.....	(983) 602-51-07	Ставрополь	(988) 958-92-70
Йошкар-Ола.....	(917) 003-14-98	Тамбов	(910) 759-24-75
Казань	(917) 260-02-22	Тверь	(910) 582-89-12
Калининград	(911) 461-45-17	Томск	(913) 016-07-43
Калуга.....	(910) 582-89-12	(983) 602-51-07
Кемерово	(913) 016-07-43	Тула.....	(910) 582-89-12
.....	(983) 602-51-07	Тюмень	(983) 181-95-90
Кострома	(910) 582-89-12	(983) 602-51-07
Краснодар	(988) 570-07-56	Ульяновск	(986) 940-76-20
Красноярск.....	(913) 016-07-43	(917) 003-14-98
.....	(983) 602-51-07	Уфа.....	(986) 940-76-20
Курган	(983) 181-95-90	Хабаровск	(914) 557-22-08
.....	(983) 602-51-07	Чебоксары	(917) 003-14-98
Курск	(910) 217-34-63	Челябинск	(983) 181-95-90
Липецк.....	(910) 250-06-90	(983) 602-51-07
.....	(910) 259-66-82	Ярославль	(910) 582-89-12

ФГУ «Научно-практический токсикологический центр ФМБА России»
тел.: +7 (495) 628-16-87; факс: +7 (495) 621-68-85

Общие указания по применению / Ответственность производителя:

Данные рекомендации основаны на нашем сегодняшнем опыте и соответствуют регламентам, утвержденным регистрирующими органами. Они не освобождают пользователя от собственной оценки и учета большого количества факторов, которые обуславливают использование и оборот нашего препарата. Поскольку производитель не оказывает влияния на хранение и применение и не может предусмотреть все связанные с этим условия, соответственно, он не несет ответственность за последствия неправильного хранения и применения. Ответственность за неправильное хранение препаратов, строгое соблюдение требований технологии и регламентов несет производитель сельскохозяйственной продукции, в том числе коллективные, фермерские хозяйства и другие организации, которые применяют пестициды. Применение препарата в других производственных сферах или по другим регламентам, прежде всего на культурах, не указанных в наших рекомендациях, нами не изучалось. Особенно это касается применения, разрешенного или зарегистрированного регистрирующими органами, не рекомендованного нами. С нашей стороны мы исключаем какую-либо ответственность за возможные последствия такого применения препарата. Различные факторы, обусловленные местными и региональными особенностями, могут влиять на эффективность препарата. Прежде всего — это погодные и грунто-климатические условия, сортовая специфика, севооборот, сроки обработок, нормы расхода, баковые смеси с другими препаратами и удобрениями (не указанными в наших рекомендациях), наличие резистентных организмов (патогенов, растений (сорняков), насекомых и других целевых организмов), нессоответствующая и/или нерегулируемая техника для применения и другое. При особено неблагоприятных условиях, не учтенных пользователями, нельзя исключать изменение эффективности препарата или даже повреждение культурных растений, за последние которых мы и наши торговые партнеры не можем нести ответственность. Пользователь средств защиты растений непосредственно несет ответственность за технику безопасности при применении, хранении и транспортировке пестицидов, а также за соблюдение действующего законодательства относительно безопасного использования пестицидов.

www.agro.bASF.ru